

JUNI 2016



Het juninummer van *Tijdschrift voor Psychiatrie*:

M/V in de psychiatrie

Therese van Amelsvoort bepleit meer aandacht voor genderspecifieke aspecten in de psychiatrie. Er zijn geslachtsverschillen in ontstaan, klinische presentatie en beloop van ziektebeelden.

Dwang en drang

Van de patiënten op een gesloten psychiatrische opnameafdeling werd bijna 40% gedwongen opgenomen. In totaal onderging 20% separatie en kreeg 14% noodmedicatie. Zij hadden vaker een psychose of een manische episode. Dit blijkt uit onderzoek van Narda Miedema en collega's in Den Haag.

Dwang bij adolescenten

Als dwang nodig zou zijn, kiezen jongeren liever voor separatie dan voor gedwongen medicatie. Dit bleek in een onderzoek van Martine van der Laan en collega's onder opgenomen adolescenten.

Medicatie bij autisme

In een onderzoek onder 263 Vlaamse jongeren met een autismespectrumstoornis bleek dat 42,6% medicatie gebruikte. De onderzoekers onder leiding van Eva Heyde zagen dat dit het meest stimulantia betrof; dit gebruik lag hoger dan elders in Europa. Het gebruik van andere psychiatrische middelen bleek lager dan in vergelijkbare Noord-Amerikaanse studies.

Noot voor de redactie

Auteurs geven graag een nadere toelichting bij hun publicatie.

Voor het stuk over geslachtsverschillen in de ggz: t.vanamelsvoort@maastrichtuniversity.nl

Voor het dwangonderzoek in Den Haag: n.miedema@palier.nl

Over de mening van jongeren over dwang: m.vanderlaan@lucertis.nl

En over het onderzoek naar medicatie bij autisme: eva.heyde1@gmail.com

VOLG ONS OOK OP TWITTER:



www.tijdstroom.nl

www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

info@tijdstroom.nl