

R.A. Achilles, psychiater, AMC De Meren, Amsterdam; S.P.J. van Alphen, psycholoog, Mondriaan Zorggroep, Heerlen; A.J.L.M. van Balkom, psychiater, GGZ inGeest, Amsterdam; C. Baeken, psychiater, UZ Brussel, Brussel; K. Baetens, psycholoog, Vrije Universiteit Brussel, Brussel; N.M. Bate-
 laan, psychiater, GGZ inGeest, Amsterdam; A.T.F. Beekman, psychiater, GGZ inGeest, Amsterdam; R.J. Beerthuis, psy-
 chiater, GGZ inGeest, Amsterdam; C. Bervoets, psychiater, Brugge; T.K. Birkenhäger, psychiater, Erasmus MC, Rotter-
 dam; Y. Biot, aios, Psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus, Mortsel; F. Boer, psychiater, Amsterdam; L.C.M. van den
 Bosch, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Pro Persona, Arnhem; M. Van Den Bossche, psychiater, CAPRI, Antwer-
 pen; M.H. Braakman, psychiater/cultureel antropoloog, Pro Persona, Renkum; J.K. Buitelaar, kinder- en jeugdpsy-
 chiater, Radboudumc, Nijmegen; H.M. de Burlet, psychiater, Haarlem; M. Calmeyn, psychiater, Loppem (Zedelgem);
 K.C.E.E.R. Cathoor, psychiater, Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg, Antwerpen; S. Colijn, psychotherapeut/kli-
 nisch psycholoog, GGZ Delfland, Delft; P. Cosyns, psychia-
 ter, Kortenberg; D. Denys, psychiater, Academisch Psychi-
 atrisch Centrum AMC, Amsterdam; L. De Picker, aios, PC
 Duffel, Duffel; M. Destoop, psychiater, PC Broeders Alexi-
 anen, Boechout; G. Dom, psychiater, PC Broeders Alexi-
 anen, Boechout; N.P.J. Draijer, klinisch psycholoog/psycho-
 therapeut, Amsterdam; R. van Dyck, psychiater, Oegstgeest;
 F. Van Den Eede, psychiater, Universitair Ziekenhuis Ant-
 werpen (UZA), Edegem; A.A. van Elburg, psychiater,
 Altrecht Eetstoornissen Rintveld, Zeist; C.M. van der
 Feltz-Cornelis, psychiater, GGZ Breburg, Tilburg; M. Fige-
 e, psychiater, AMC, Amsterdam; J. De Fruyt, psychiater-psy-
 chotherapeut, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Brugge; R.J.
 van der Gaag, psychiater, Nijmegen; L. Gabriels, psychiater,
 UZ Leuven, Leuven; H.M. Geurts, psycholoog, Universiteit
 van Amsterdam, Amsterdam; H. Gijsman, psychiater, Pro
 Persona, Nijmegen; I. Glazemakers, psychiater, Universi-
 teit Antwerpen, Antwerpen; K.R. Goethals, forensisch
 psychiater, UZ Antwerpen, Antwerpen; R. de Graaf, psychi-
 ater, Trimbos-instituut, Utrecht; F. de Groot, psycholoog,
 Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen, Boechout; H.
 de Haan, psychiater, Tactus Verslavingszorg, Deventer; N.
 van Haren, psycholoog, UMC Utrecht, Utrecht; P.N. van
 Harten, psychiater, GGZ Centraal, Amersfoort; M. Heb-
 brecht, psychiater, P.Z. Sancta Maria Sint-Truiden, Tonge-
 ren; A.M. van Hemert, psychiater, LUMC, Leiden; M. Her-
 mans, kinder- en jeugdpsychiater, Mechelen; O.A. van den
 Heuvel, psychiater, VUmc, Amsterdam; C.A.L. Hoogduin,
 psycholoog, Radboud Universiteit, Nijmegen; A.J.K. Hon-
 dius, psychiater, GGZ Centraal, Ermelo; P. Höppener, psy-
 chiater, Reinier van Arkel, Den Bosch; H. Hovens, psychia-
 ter, Leiden; C.A.J. van Houwelingen, psychiater, GGZ E,
 Eindhoven; J.W. Hummelen, psychiater, GGnet, Apeldoorn;
 T.J.M. Ingenhoven, psychiater, Pro Persona, Lunteren; G.
 Jacobs, psychiater, Centre for Human Drug Research, Lei-
 den; A.J.A. Kaasenbrood, psychiater, Pro Persona, Wolfheze;
 F. Kamphuis, psychiater, De Viersprong, Amsterdam; I.P.M.
 Keet, psychiater-epidemioloog, GGZ Noord-Holland-
 Noord, Alkmaar; A. de Keijser, klinisch psycholoog-psy-
 chotherapeut, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen;
 G.P.J. Keijsers, gz-psycholoog-psychotherapeut, Radboud
 Universiteit Nijmegen; A.J.E.M. Kerkhof, klinisch psycho-
 loog, VU, Amsterdam; D. Khasho, gz-psycholoog, GGZ
 Breburg, Tilburg; A.C.M. Kleinsman, psychiater, Dimence,
 Deventer; H. Knegtering, psychiater, Academisch Zieken-
 huis Groningen, Groningen; F.A.M. Kortmann, psychiater,
 Arnhem; C.G. Kooiman, psychiater, Rivierduinen, Zoeter-
 meer; R. Kupka, psychiater, Altrecht, Utrecht; A.S. de
 Leeuw, psychiater, GGZ Centraal, Ermelo; L. Lemey, oude-
 renpsychiater, AZ St Jan av, Brugge; A. Liégeois, theoloog,
 Universiteit Leuven, Leuven; M. Lochmann van Benne-
 kom, psychiater, Pro Persona, Nijmegen; J. Luykx, psychia-
 ter, UMC Utrecht, Utrecht; H.J.C. van Marle, psychiater,
 Rotterdam; H. Merckelbach, forensisch psycholoog, Uni-
 versiteit Maastricht, Maastricht; G. Meynen, psychiater,
 VU, Amsterdam; C.L. Mulder, psychiater, Erasmus MC,
 Rotterdam; N.J. Nicolai, psychiater-psychotherapeut, Rot-
 terdam; H.L.I. Nijman, forensisch psycholoog, De Kijvelan-
 den, Poortugaal; M.G. Nijs, psychiater, NVvP, Utrecht; W.A.
 Nolen, psychiater, Haarlem; A. Nugter, onderzoeker, GGZ-
 NHN, Heiloo; H. Nys, hoogleraar Medisch recht, KU Leu-
 ven, Leuven; P. van Oppen, psycholoog, VUmc/GGZ
 inGeest, Amsterdam; T. Pattyn, psychiater, Universiteit
 Antwerpen, Antwerpen; F. Peeters, psychiater, Maastricht
 University, Maastricht; H.D. Philipszoon, psychiater,
 Amstelveen; C.G. Reichart, kinder- en jeugdpsychiater,
 Curium-LUMC, Oegstgeest; G. van Rijsbergen, gz-psycho-
 loog, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen; H. Ripper,
 klinisch psycholoog, VU, Amsterdam; L. Roelens, psychia-
 ter-psychotherapeut, Sint-Martens-Latem; R. Schoevers,
 psychiater, UMC Groningen, Groningen; P.E.J. Schulte,
 psychiater, GGZ NHN, Alkmaar; N. Schutter, psychiater,
 Mentrum, Amsterdam; J.P.C. Selten, psychiater, GGZ
 Rivierduinen, Leiden; F. Smit, hoogleraar Public Mental
 Health, Trimbos-instituut, Utrecht; H.N. Sno, psychiater,
 Zaans Medisch Centrum, Zaandam; I.E.C. Sommer, psychi-
 ater, UMC Utrecht, Utrecht; A. Speckens, psychiater, Rad-



boud University Nijmegen, Nijmegen; A.A. Spek, psycholoog, GGz Eindhoven, Eindhoven; W.G. Staal, kinder- en jeugdpsychiater, Karakter, Nijmegen; M.L. Stek, ouderenpsychiater, GGz inGeest, Amsterdam; J.C. van der Stel, lector Geestelijke Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden; A.W.M.M. Stevens, psychiater, Dimence, Deventer; J.J. Stolker, psychiater, Altrecht, Den Dolder; M.M. Thunnissen, psychiater, Bergen op Zoom; B. Tiemens, andragoog/epidemioloog, Pro Persona, Nijmegen; W. van Tilburg, psychiater, Aalsmeer; E. Thys, psychiater, UPC KU Leuven, Leuven; H.L. Van, psychiater, Arkin, Amsterdam; A. Vellinga, psychiater, Mentrum, Amsterdam; P.J. Verhagen, psychiater, GGz Centraal, Harderwijk; F.R.J. Verhey, psychiater, Maastricht University, Maastricht; W.M.A. Verhoeven, psychiater, Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie, Venray; R.J. Verkes, psychiater, Radboud University, Nijmegen; V. de Vogel, psycholoog, Van der Hoeven Stichting, Utrecht; M.G. Vollema, klinisch psycholoog, GGz Centraal, Ermelo; R. de Vries, psychiater, Amstelveen; J.A. van Waarde, psychiater, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem; J. van Weeghel, andragoog, Kenniscentrum Phrenos, Utrecht; D. Van West, kinder- en jeugdpsychiater, Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UCKJA), Antwerpen; G.A.M. Widdershoven, filosoof/ethicus, Metamedica VUmc, Amsterdam; J. Wiersma, psycholoog, GGZ inGeest, Amsterdam; T. de Wolf, gz-psycholoog, Amsterdam; L. Wunderink, psychiater, GGZ Friesland, Leeuwarden; H.J.M. Zonder, psychiater, Culemborg.

VERBETERING

In het artikel 'De tbs-maatregel: kosten en baten in perspectief' van Nagtegaal e.a. (2016; 58: 739-45) moet voor 3 van de 4 recidivecijfers (38,9%, 63,8% en 72,1%) over ex-gedetineerden in tabel 1, (voetnoot h) in plaats van naar Wartna e.a. (2014b) verwezen worden naar de WODC-Recidive-monitor (2014), een webapplicatie te vinden op: <https://wodc-repris.nl/Repris.html>.