

**Tabel 2. Overzicht van de geïncludeerde studies en de belangrijkste bevindingen**

Eerste auteur, jaartal en land	Studie-opzet	Populatiegrootte (% vrouw)	Gem. leeftijd in j (SD, uitersten)	Diagnose	Setting	MFT-model	Aantal MFT-sessies	Lengte van behandeling
Dennhag 2019 Zweden17	Observationele casusserie:  MFT + TAU	24 (100%) Moeders: 23 Vaders: 22	13,91 (1,12; 13-16)	AN (37,5%) EDNOS (62,5%)	Ambulant (7 patiënten startten MFT tijdens opname)	Wallins manual	10,5 dagen	12 maanden
Eisler 2016 VK6	Multi-center-RCT:  MFT + FT-AN (n=85) vs. FT-AN (n=82)	167 (91%)	15,7 (1,7; 12-20)	AN (76%) EDNOS-R (24%)	Ambulant	Maudsley-model	10 sessies	12 maanden
Gelin 2015 België16	Observationele casusserie	82 (98%)	16,03 (1,46; 11-19)	AN-R (84,1%) AN-BP (10,9%) BN (4,9%)	Ambulant	Maudsley-georiënteerd	21 dagen	+/- 11 maanden

Meting vooraf	Resultaten einde behandeling	Follow-up	Uitval tijdens behandeling
Gem. (SD) of mediaan (IQR)	Gem. (SD), mediaan (IQR)	Gem. (SD) of mediaan (IQR)	(%)
<b>BMI:</b> 17,9 (2,0) <b>%EBW:</b> 93 (13,68) <b>EDE-Q:</b> 2,93 (1,61) <b>CGAS:</b> 48,09 (7,25) <b>EDSIS totaal:</b> <b>Moeders</b> 39,87 (11,97) <b>Vaders</b> 34,09 (11,88)	Na 12 maanden: <b>Primaire uitkomsten</b> <b>BMI:</b> 20,08 (2,17)*** <b>%EBW:</b> 101,26 (10,01)** <b>EDE-Q:</b> 1,97 (1,9) * <b>CGAS:</b> 61,68 (11,5)*** <b>Secundaire uitkomsten</b> <b>EDSIS totaal:</b> <b>Moeders</b> 26,87 (15,88) *** <b>Vaders</b> 23,91 (11,22) **	Geen	nr
<b>MRO:</b> 8% (MFT) 10% (FT) <b>%mBMI:</b> 77,6 (6,3) (MFT) 78,4 (5,8) (FT) <b>EDE</b> <b>BDI:</b> 23,9 (14,3) (MFT) 25,2 (14,4) (FT) <b>ECI: negatief</b> 85,56 (nr) (totaal) <b>Positief</b> 28,27 (nr) (totaal)	Na 12 maanden: <b>Primaire uitkomst</b> <b>MRO:</b> 76% (MFT); 58% (FT); significant verschil, oddsratio 2,55* <b>Secundaire uitkomsten</b> <b>%mBMI:</b> 91,03 (95%-BI: 88,94-91,13) (MFT) *** 88,78 (95%-BI: 86,59-90,98) (FT) *** <b>EDE:</b> ↑ EDE-R**, -EC**, -SC** en -WC* (MFT) ↑ EDE-R**, -EC***, -SC*** en -WC*** (FT) <b>BDI:</b> 18,55 (95%-BI: 14,27-22,84) (MFT) ** 15,65 (95%-BI: 11,2-20,14) (FT) *** <b>ECI:</b> negatief 69,75 (95%-BI: 58,68-80,83)(MFT) ** 71,97 (95%-BI: 60,98-82,97) (FT) * Positief 29,40 (95%-BI: 27,28-31,52) (MFT) 28,67 (95%-BI: 26,66-30,72) (FT) <b>CSQ:</b> Jongeren Zeer tevreden: 15,1% (MFT); 15,7% (FT) Matig tevreden: 24,4% (MFT); 22,9% (FT) Laag tevreden: 9,3% (MFT); 6% (FT) Missende gegevens: 51,2% (MFT); 55,4% (FT) Ouders Zeer tevreden: 33,7% (MFT); 32,5% (FT) Matig tevreden: 17,4% (MFT); 15,7% (FT) Laag tevreden: 5,8% (MFT); 8,4% (FT) Missende gegevens: 43% (MFT); 43,4% (FT) Significant hoger bij ouders dan bij jongeren (totaal) ***	Na 18 maanden: <b>Secundaire uitkomsten</b> <b>MRO:</b> 78% (MFT); 57% (FT) <b>%mBMI:</b> 91,68 (95%-BI: 89,33-94,03) (MFT) *** 87,58 (95%-BI: 85,13-90,03) (FT) *** Significant grotere stijging in MFT vs FT* <b>EDE:</b> EDE-R***, -EC***, -SC* (MFT) EDE-R***, EDE-EC***, EDE-SC*** en EDE-WC** (FT) <b>BDI:</b> 19,22 (95%-BI: 14,6-23,85) (MFT) * 17,07 (95%-BI: 12,43-21,72) (FT) **	9 (11%) (MFT) 9 (11%) (FT)
<b>%EBW:</b> 76,99 (9,75) <b>EDI:</b> 11 dimensies <b>OQ:</b> 77,78 (27,26)	Na +- 11 maanden: <b>%EBW:</b> 86,75 (11,2) *** <b>EDI:</b> ↑ in 10 dimensies, ** of *** <b>OQ:</b> 46,36 (32,62) ***	1 jaar na einde behandeling (voorlopige resultaten): <b>%EBW:</b> Verdere , uitkomst nr <b>EDI:</b> Gestabiliseerd, uitkomst nr <b>OQ:</b> Gestabiliseerd, uitkomst nr	7 (8,5%) Verlies bij follow-up: 40 (48,7%)

**Tabel 2. Overzicht van de geïnccludeerde studies en de belangrijkste bevindingen (vervolg)**

Marzola 2015 VS <sup>5</sup>	Gecontroleerde follow-upstudie, retrospectief:  Intensieve MFT (n=54) vs Intensieve FT (n=20)	74 (92%)	14,74 (2,81)	AN (59,5%) EDNOS-R (40,5%)	Ambulant	'Intensified FT-AN'	5 dagen (40 uren)	1 week
---------------------------------	--	----------	-----------------	----------------------------------	----------	------------------------	----------------------	--------

---

## OVERZICHTSARTIKEL

%EBW: 86,36 (8,74) (totaal)	nr	Na gem. 30 maanden: <b>Duur follow-up in maanden:</b> 22,5 (14,37) (MFT) 53,4 (16,07) (FT) 30,85 (20,2, 4-83) (totaal) Significant verschil tussen MFT en FT *** %EBW: 97,83 (10,14) (MFT) 102,17 (17,47) (FT) 99 (12,57) (totaal) *** <b>Outcome (gewicht en ED-symptomen)</b> Volledige remissie: 59,3% (MFT); 65% (FT) Partiële remissie: 27,7% (MFT); 25% (FT)	0 (0%) Verlies bij follow-up: 18 (20%)
-----------------------------	----	--	--