

Onlinebijlage C:

Studie	Opzet	N (aantal mannelijk geslacht)	Gem. leeftijd (spreiding)	Actieve behandelingsgroep (beschrijving van het protocol)	Aantal sessies + duur	Vorm	Vergelijkings- groep(en) (beschrijving van het protocol)	Resultaten gemeten met de gebruikte klinische beoordelingsschaal(en) gemiddelde (standaarddeviatie)	Remissieresultaten (remissiecriteria)
Lewin AB et al., 2014 ²⁵	RCT	31 (12)	5,8 (3-8)	(a) FB-ERP (n = 17) (PE + ERP + CT + FAR + HW + TP)	12 sessies (60 min.) over 6 weken	Individueel	(b) TAU (n = 14) (bleven hun eerdere interventies ontvangen)	CY-BOCS: (a) Pre-T: 24,47 (5,80) Post-T: 12,29 (8,61) (d = 1,8) 1 ma FU: 11,50 (5,28) 3 ma FU: 10,56 (6,25) (b) Pre-T: 24,50 (5,68) Post-T: 24,00 (4,35) (d = - 0,09) CGI-S: (a) Pre-T: 3,82 (0,81) Post-T: 2,47 (1,37) 1 ma FU: 2,10 (0,74) 3 ma FU: 2,00 (0,87) (b) Pre-T: 3,93 (0,73) Post-T: 4,00 (0,68)	(a) Post-T: 58,8% (b) Post-T: 0% (Freeman et al., 2008; CY-BOCS- scores van ≤ 12 post-T)
Rosa Alcázar Al et al., 2017 ²⁶	CCT	20 (13)	6,62 (5-7)	(a) CBFT (n = 10) (PE + ERP + CT + FAR + HW + TP)	(a) 12 sessies (60 min.) over 12 weken	Individueel	(b) PT (n = 10) (PE + FAR + HW + TP)	CY-BOCS: (a) Pre-T: 25,50 (3,03) Post-T: 13,20 (3,85) (z = -2,67, p = 0,007) 3 ma FU: 10,6 (4,79) (z = -2,70, p = 0,007) (b) Pre-T: 24,40 (4,76) Post-T: 12,50 (1,35) (z = -2,80, p = 0,005) 3 ma FU: 10,70 (0,82) (z = -2,87, p = 0,004)	(a) Post-T: 70% 3 ma FU: 90% (b) Post-T: 60% 3 ma FU: 100% (Freeman et al., 2008; Lewin et al., 2014a; CY-BOCS ≤ 12)
Comer JS et al., 2017 ²⁷	RCT	22 (13)	6,65 (4-8)	(a) Klinische FB- CBT (n = 11) (ERP + CT + FAR + HW)	12 sessies over 14 weken	Individueel	(b) Via internet aangeboden FB- CBT (n = 11)	CY-BOCS: (a) Pre-T: 23,2 (3,2) Post-T: 14,2 (7,8) (d = 1,64) 6 ma FU: 10,7 (8,3) (d = 1,45) (b) Pre-T: 22,9 (4,1) Post-T: 14,9 (7,3) (d = 1,53) 6 ma FU: 11,8 (9,5) (d = 1,27) CGI-S: (a) Pre-T: 4,6 (0,9) Post-T: 3,3 (1,6) (d = 1,09) 6 ma FU: 2,8 (1,6) (d = 0,83)	/

								(b) Pre-T: 4,9 (0,7) Post-T: 3,2 (1,5) (d = 1,59) 6 ma FU: 2,6 (2,5) (d = 1,16)	
Rosa Alcázar Á et al., 2019 ²⁸	RCT	44 (33)	6,66 (5,2-7,9)	(a) CBFT van kind + ouders (n = 14) (PE + ERP + CT + FAR + HW)	12 sessies (60 min.) over 12 weken + 1 booster-behandeling 3 ma post-T	Individueel	(b) CBFT van kind + moeder (n = 15) (c) behandeling van moeder (n = 15)	CY-BOCS: (a) Pre-T: 22,86 (3,05) Post-T: 10,14 (1,41) 3 ma FU: 8,79 (0,89) (b) Pre-T: 22,47 (4,37) Post-T: 10,67 (2,02) 3 ma FU: 8,80 (1,21) (c) Pre-T: 22,87 (4,24) Post-T: 11,80 (1,78) 3 ma FU: 10,27 (1,03)	(a) Post-T: 71,4% 3 ma FU: 100% (b) Post-T: 40% 3 ma FU: 93,3% (c) Post-T: 20% 3 ma FU: 53,3% (Jacobson & Truax, 1991; 2SD onder het gemiddelde bij post-T)
Freeman JB et al., 2008 ²⁹	RCT	42 (18)	7,11 (5-8)	(a) FB-CBT (n = 22) (PE + ERP + CT + FAR + HW)	12 sessies (60-90 min.) over 14 weken	Individueel	(b) FB-RT (n = 20) (PE + RE + HW)	CY-BOCS: (a) Pre-T: 22,88 (4,30) Post-T: 11,50 (7,68) (b) Pre-T: 22,00 (5,13) Post-T: 16,87 (7,68)	(a) Post-T: 69% (b) Na T: 20% (p < .01; 95% BI 1,69-45,76) (Foa et al., in preparation; CYBOCS ≤ 12 post-T)
Lavell CH et al., 2016 ³⁰	UCT	43 (30)	11,09 (7-17)	FB-CBT (PE + ERP + CT + FAR + HW + TP)	18 sessies (60-90 min.) over 13 weken + 2 boostersessies 1 ma en 3 ma post-T	Groep + individueel	/	CY-BOCS: Pre-T: 21,36 (6,63) Post-T: 12,37 (8,04) 6 ma FU: 10,32 (7,37) 12 ma FU: 10,12 (8,25)	12 ma FU: 41,9% (Storch et al., 2010; ≥ 50% reductie en score van < 14 op CYBOCS)
Dekel I et al., 2021 ³¹	UCT	25 (14)	11,14	SPACE (ouder PE + FAR)	10-12 sessies (60 min.)	Groep	/	GCI-S: Pre-T: 4,35 (0,57) Post-T: 3,22 (1,16) (t(22) = 6,24, p < 0,001)	/
Barrett P et al., 2004 ³²	RCT	77 (38)	11,8 (7-17)	(a) Individuele CBFT (n = 24) (PE + ERP + CT + FAR + HW + TP)	14 sessies (90 min.) over 14 weken + 2 boostersessies (1ma + 3 ma post-T)	Individueel versus groep	(b) Groep CBFT (n = 29) (c) 4-6 weken wachtlijst controlegroep (n = 24)	CY-BOCS: (a) Pre-T: 23,64 (4,30) Post-T: 8,36 (6,93) (b) Pre-T: 21,38 (5,62) Post-T: 8,28 (7,33) (c) Pre-T: 22,95 (5,49) Post-T: 24,04 (4,14)	(a) 3 ma FU: 82% 6 ma FU: 65% (b) 3 ma FU: 76% 6 ma FU: 87% (vrij van OCS)
Piacentini J et al., 2011 ³³	RCT	71 (28)	12,2 (8-17)	(a) FB-CBT (n = 49) (PE + ERP + CT + FAR + TP)	12 sessies (90 min.) over 14 weken	Individueel	(b) PRT (n = 22) (PE + RE + HW)	CY-BOCS: (a) Week 0: 24,7 Week 4: 21,7 Week 8: 18,6 Week 14: 13,3 (d = 2,37) (b) Week 0: 25,3 Week 4: 23,5 Week 8: 18,9 Week 14: 17,2 (d = 1,80)	(a) Week 14: 42,5% (b) Week 14: 17,6% (POTS, 2004; CY-BOCS totale score < 11)

Peris TS et al., 2012 ³⁴	RCT	20 (11)	12,50 (8-17)	(a) PFIT (n = 10) (PE + ERP + CT + FAR)	(a) 18 sessies (60 min.) over 14 weken (b) 12 sessies (90 min.) over 14 weken	Individueel	(b) ST (n = 10) (kind ERP + CT + HW, ouder PE)	CY-BOCS: (a) Week 0: 25,50 (2,88) Week 14: 11,00 (7,37) Week 24: 13,25 (8,43) (b) Week 0: 25,40 (4,25) Week 14: 16,10 (8,27) Week 24: 15,25 (5,52)	(a) Post-T: 50% (b) Post-T: 20% (POTS, 2004; CYBOCS ≤ 10)
Whiteside SP et al., 2014 ³⁵	BCT	22 (15)	12,59 (7-18)	5 dagen intensieve ERP (PE + ERP + HW)	10 sessies (50 min.) over 5 dagen	Individueel	/	CY-BOCS: Baseline: 24,79 (4,28) Pre-T: 25,00 (5,55) Post-T: 15,67 (5,24) (p < 0,001, d = 1,37) 3 ma FU: 10,11 (4,81) (p < 0,005, d = 1,00)	/
Peris TS et al., 2017 ³⁶	RCT	62 (43)	12,71 (8-17)	(a) PFIT (n = 32) (PE + ERP + CT + FAR)	(a) 18 sessies (60 min.) over 14 weken (b) 12 sessies (90 min.) over 14 weken	Individueel	(b) ST (n = 30) (kind ERP + CT + HW, ouder PE)	CY-BOCS: (a) Pre-T: 25,38 (3,86) Post-T: 13,45 (7,17) (b) Pre-T: 25,47 (3,33) Post-T: 17,50 (7,48)	(a) Post-T: 58% (b) Post-T: 27% (Storch EA et al., 2010; CY-BOCS ≤ 14 post-T)
Merlo LJ et al., 2009 ³⁷	UCT	49 (27)	12,8 (6-18)	FB-CBT (ERP + CT + FAR + HW)	14 sessies (90 min.)	Individueel	/	CY-BOCS: Pre-T: 27,5 (5,5) Post-T: 10,0 (6,8) (t = 17,23, p < 0,001, d = 3,52)	/
Storch EA et al., 2007 ³⁸	RCT	40 (18)	13,3 (7-17)	(a) Wekelijkse FB-CBT (n = 20) (PE + ERP + CT + FAR + HW)	14 sessies (90 min.) (a) over 14 weken over 3 weken	Individueel	(b) Intensieve FB-CGT (n = 20)	CY-BOCS: (a) Pre-T: 25,4 (5,8) Post-T: 12,8 (8,8) (d = 1,73) 3 ma FU: 9,8 (7,6) (d = 2,33) (b) Pre-T: 25,9 (5,6) Post-T: 9,5 (6,9) (d = 2,62) 3 ma FU: 10,2 (8,7) (d = 2,20) CGI-S: (a) Pre-T: 3,5 (0,8) Post-T: 1,9 (1,1) (d = 1,68) 3 ma FU: 1,3 (1,0) (d = 2,44) (b) Pre-T: 4,2 (0,8) Post-T: 1,4 (0,9) (d = 3,29) 3 ma FU: 1,4 (1,0) (d = 3,11)	(a) Post-T: 50% 3 ma FU: 77% (b) Post-T: 75% 3 ma FU: 72% (ernstscore op ADIS-IV-P ≤ 3 en CY-BOCS-totaalscore ≤ 10)

Storch EA et al., 2010 ²⁴	UCT	30 (15)	13,4 (7-19)	Intensieve FB-CGT (PE + ERP + CT + FAR + HW + TP)	14 sessies (90 min.) over 3 weken	Individueel	/	CY-BOCS: Pre-T: 26,93 (4,65) Post-T: 12,37 (7,34) (p < .001 d = 2,37) 3 ma FU: 12,41 (7,87) (p < .001 d = 2,24) CGI-S: Pre-T: 4,70 (0,60) Post-T: 2,14 (1,09) (p < .001 d = 2,91) 3 ma FU: 2,21 (1,08) (p < .001 d = 2,85)	Post-T: 56,6% 3 ma FU: 53,3% (Storch, Geffken, Merlo, Mann, et al., 2007; ernstscore op ADIS-IV- Pat van 3 of minder en CYBOCS- totaalscore van 10 of minder)
Farrell LJ et al., 2016 ³⁹	BCT	10 (6)	13 (11-16)	Korte intensieve CGT met e-therapie als onderhoud na baselineperiode van 1 of 2 zeken (PE + ERP + CT + FAR + HW + TP)	1 sessie PE (60 min.) + 2 sessies CBT (180 min.) over 2 weken + 3 sessies e-therapie (45 min.) over 3 weken	Individueel	/	CY-BOCS: Pre-T: 29,10 (4,18) Post-T: 14,80 (7,68) (t(9) = 14.30, p = 0.001) 6 ma FU: 11,80 (8,88) (t(9) = 17.30, p = 0.001) CGI-S: Pre-T: 5,60 (0,52) Post-T: 3,10 (1,45) (t(9) = 2.50, p = 0.001) 6 ma FU: 2,70 (1,57) (t(9) = 2.90, p < 0.001)	Post-T: 60% 6 ma FU: 70% (Storch, Lewin, De Nadai, Murphy, 2010; ≥ 50% vermindering op CY-BOCS, evenals een score van ≤ 14)
Selles RR et al., 2018 ⁴⁰	UCT	85 (39)	13,9 (8-18)	GF-CBT (PE + ERP + CT + FAR + HW + TP)	12 sessies (90 min.) over 12 weken	Groep + individueel	/	CY-BOCS: Pre-T: 23,48 (5,04) Post-T: 14,63 (6,89) (t = 13.05, p < 0,001 d = 1,47) 1 ma FU: 13,78 (7,90) (d = 0,11)	Post-T: 37,8% (Skarphedinsson et al., 2016; CY-BOCS 55% reductie of totale score < 11)
Riise EN et al., 2019 ⁴¹	UCT	63 (27)	14,4 (11-18)	B4DT (PE + ERP + FAR + TP)	4 opeenvolgende dagen (180 + 360 + 360 + 180 min.)	Groep	/	CY-BOCS: Pre-T: 26,55 (4,06) Post-T: 8,57 (5,21) (t = 22,51, p < .001 d = 3,85) 6 ma FU: 6,63 (6,82) (t = 20,80, p < .001 d = 3,55)	Post-T: 77,8% 6 maanden FU: 73,0% (Mataix-Cols D, de la Cruz LF, et al., 2016; ≥ 35% vermindering op CY-BOCS en totale score ≤ 12)
Baruah U et al., 2018 ⁴²	RCT	64 (35)	30,40 (18-45)	(a) BFBI (n = 30) (PE + ERP + FAR)	(a) 6 sessies (90-120 min.) over 3-4 weken (b) 6 sessies (30-45 min.)	Individueel	(b) RE (n = 34) (PE + RE)	Y-BOCS: (a) Pre-T: 24,80 (3,89) 1 ma FU: 20,20 (5,81) 3 ma FU: 17,13 (7,04) (b) Pre-T: 25,02 (3,35) 1 ma FU: 22,64 (4,69) 3 ma FU: 21,76 (5,92) (F = 7,689, p = 0,004) CGI-S: (a) Pre-T: 4,53 (0,62) 1 ma FU: 4,13 (0,93) 3 ma FU: 3,56 (1,07) (b) Pre-T: 4,70 (0,62) 1 ma FU: 4,58 (0,60) 3 ma FU: 4,29 (0,87) (F = 3,936, p = 0,026)	/ (Eddy et al., 2004; Y-BOCS-score van < 16)

Abramowitz JS et al., 2013 ⁴³	UCT	18 (1)	33,13 (≥ 18)	Cognitieve gedragstherapie voor koppels (PE + ERP + CT + FAR + HW)	16 sessies (90-120 min.) over 12 weken	Individueel	/	Y-BOCS: Pre-T: 25,75 (5,11) Post-T: 11,56 (5,48) (d = 2,68) 6 ma FU: 12,25 (5,40) (d = 2,57) 12 ma FU: 11,33 (6,47) (d = 2,42)	/
Boeding SE et al., 2013 ⁴⁴	UCT	20 (1)	34 (24-66)	Cognitieve gedragstherapie voor koppels (PE + ERP + CT + FAR + HW)	16 sessies (90 min.) over 12 weken	Individueel	/	Pre-T: 25,95 (5,30) Post-T: 11,56 (5,47) (gepaarde t(15) = 6,84, p < 0,001)	/
Thompson-Hollands J et al., 2015 ⁴⁵	RCT	18 (6)	35,44	(a) BFBI (n = 9) (ERP + ouder PE + FAR)	(a) (b) + 2 sessies alleen voor het gezin (120 min.) (b) gemiddeld 17,79 sessies over 25 weken	Individueel	(b) Wekelijkse poliklinische ERP (n = 9) (ERP)	Y-BOCS-II: (a) Pre-T: 28,78 (6,08) Week 4: 26,56 (5,34) Week 8: 22,11 (4,86) Week 16: 16,75 (4,95) Week 25: 15,50 (8,12) (b) Pre-T: 31,89 (5,58) Week 4: 29,56 (7,72) Week 8: 28,12 (4,58) Week 16: 24,25 (7,01) Week 25: 22,62 (7,13)	/
Gomes JB et al., 2016 ⁴⁶	RCT	98 (37)	(a) 44,5 (b) 37,1 (18-65)	(a) CBGT met kortdurende familie-betrokkenheid (n = 52) (PE + ERP + CT + FAR + HW + TP)	12 sessies (120 min.) over 3 maanden	Groep	(b) Controle (wachtlust) (n = 46)	Y-BOCS: (a) Pre-T: 27,37 (0,79) Post-T: 13,8 (1,26) (b) Pre-T: 26,47 (0,80) Post-T: 24,77 (0,86) (p < 0,001)	/

Opmerking: **N** = aantal steekproefpatiënten, **(C)Y-BOCS** = Children's Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale; **CGI-S** = Clinical Global Impression-Severity; **RCT** = gerandomiseerde gecontroleerde studie; **CCT** = gecontroleerde studie; **UCT** = ongecontroleerde studie; **BCT** = baseline gecontroleerde studie; **FB-ERP** = familiegerichtte exposure en responspreventie; **PE** = psycho-educatie; **ERP** = exposure and response prevention; **CT** = cognitieve therapie; **FAR** = familie-accommodatie reductie; **HW** = huiswerk; **TP** = terugvalpreventie; **TAU** = gebruikelijke behandeling; **Pre-T** = vóór behandeling; **Post-T** = na behandeling; **-mo FU** = follow-up na -maanden; **CBFT** = cognitief-gedragsmatige familiegerichtte behandeling; **PT** = oudertraining; **FB-CBT** = familiegerichtte cognitieve gedragstherapie; **SD** = standaardafwijking; **FB-RT** = familiegerichtte ontspanningstherapie; **RE** = ontspanningsoefeningen; **SPACE** = Supportive Parenting of Anxious Childhood Emotions (ondersteunend ouderschap voor angstige emoties bij kinderen); **OCD** = obsessief-compulsieve stoornis; **PRT** = psycho-educatie/ontspanningstraining; **PFIT** = positieve familieinteractietherapie; **ST** = standaardbehandeling; **ADIS-IV-P** = Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV-Parent version; **GF-CBT** = cognitieve gedragstherapie in groepsverband voor families; **B4DT** = Bergen 4-day Treatment; **BFBI** = korte familiegerichtte interventie; **CBGT** = cognitieve gedragstherapie in groepsverband